

# Nourrir les chevreuils?


## Cerfs de Virginie



Pensant bien faire, beaucoup de gens aménagent des mangeoires à chevreuils où ils déposent des fruits, des légumes, de la luzerne, de la moulée ou du grain. Or, cette nourriture qui n'est pas adaptée au système digestif des cerfs rend les bêtes malades peut même aller jusqu'à les tuer.

Un chevreuil a besoin d'1Kg de ramilles par jour;

- Érable à épis;
- Noisetier;
- Sapin baumier;
- Pruche;
- Thuya;
- Érable rouge;
- Érable à sucre;
- Cornouiller;
- Chèvrefeuille;
- Bouleau jaune.



## Ramilles préférées des chevreuils

AU QUÉBEC, NOURRIR LES CERFS DE VIRGINIE EST UNE PRATIQUE COMMUNE PENDANT L'HIVER. MAIS CETTE PRATIQUE, INTERDITE À PLUSIEURS ENDROITS, NUIT AUX CERFS ET COMPROMET MÊME LEUR SURVIE, PRÉVIENNENT LES RESPONSABLES DE LA FAUNE.

Outre les problèmes de santé associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut engendrer d'autres conséquences, notamment :

- la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables, en dehors des ravages;
- la déprédation (dommages à la propriété privée) près des sites d'alimentation, en particulier sur les terres agricoles et les vergers, sans oublier celle pouvant être causée aux arbustes ornementaux;
- l'augmentation du nombre d'accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité d'une route;
- la surutilisation de l'habitat du cerf au voisinage des sites d'alimentation par une trop grande concentration d'animaux;
- des maladies et de la mortalité causées par la consommation d'aliments inadéquats;
- la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage : ingestion de nourriture contaminée par la salive, l'urine et les excréments;
- les activités de braconnage : le nourrissage facilite l'abattage des cerfs hors saison à courte distance avec des armes de petits calibres.